

病名

下記について同意しました。(本人・家族)

診断群分類
区分名称

担当医師

担当看護師

社会医療法人 北海道循環器病院

担当薬剤師

担当管理栄養士

担当理学療法士

	(治療決定日)		(手術当日)		
	外来	入院日(手術前日)	手術前	手術後	手術後1日目
目標		# 心身ともに安定した状態で手術にのぞむことができる		# 合併症の出現がない 1. ペースメーカー作動不全がない 2. 創部から出血がない 3. 局所感染がない	
処置		<ul style="list-style-type: none"> 身長、体重、体温、脈拍、血圧を測定します。 ペースメーカーを入れる部位の体毛をカットします。 24時間モニター心電図をつけます。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術の30分前に点滴の管を入れ、点滴をします。 検査室へ行く前に体温、脈拍、血圧を測定します。 24時間モニター心電図をつけます。 	<ul style="list-style-type: none"> 体温、脈拍、血圧を測定します。 創部から出血がないか時々確認します。 創部には、半透明のドレッシング剤をはり、手術後7日目まで交換は致しません。 24時間モニター心電図をつけます。 治療後1時は酸素吸入を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 体温、脈拍、血圧を測定します。 24時間モニター心電図をつけます。
薬	<ul style="list-style-type: none"> 中止するお薬(ビグアナイド製剤)がある場合、手術2日前より中止することを説明します。 	<ul style="list-style-type: none"> 中止するお薬がある場合、内服していないか確認します。 	<ul style="list-style-type: none"> 内服は看護師の指示に従って下さい。 抗生物質の点滴をします。 	<ul style="list-style-type: none"> 抗生物質の点滴を 血糖降下薬を再開 	<ul style="list-style-type: none"> 中止していた薬が開始となります。 1日3回の抗生物質の点滴をします。
検査				<ul style="list-style-type: none"> 胸のレントゲン写真と心電図をとります。 	<ul style="list-style-type: none"> 胸のレントゲン写真と心電図をとります。
食事 飲水		<ul style="list-style-type: none"> 通常通りです。 一週間以内に管理栄養士が栄養指導に参ります。特別な栄養管理の必要性がある場合、栄養管理計画に基づいた管理を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術前の食事(朝・昼)は禁食です。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術1時間後より食事、飲水ができますが、医師の指示により制限をすることがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> 通常通りです。
活動		<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術まで制限はありません。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術後3時間はベッド上安静となります。 手術をした方の腕は90度以上挙げないようにして下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術をした方の腕は90度以上挙げないようにして下さい。
清潔		<ul style="list-style-type: none"> (体毛をカットしたあと)シャワーができます。 		<ul style="list-style-type: none"> シャワー・入浴はできません。タオルで体をお拭きします。 	<ul style="list-style-type: none"> シャワー・入浴はできません。タオルで体をお拭きします。
指導 説明		<ul style="list-style-type: none"> 看護師より手術についての説明を行います。 手術同意書、造影剤検査同意書の提出をお願いします。 			
		<ul style="list-style-type: none"> 薬剤師より薬について、栄養士より食生活についてそれぞれ説明します。 			

※状況に応じて、予定が変更になる場合があります。不明な点がありましたら、ご遠慮せずおたずねください。

病名

社会医療法人 北海道循環器病院

	手術後2日目	手術後3日目	手術後4日目	手術後5日目	手術後6日目	手術後7日目(退院日)
目 標	# 合併症が発生しない 1. ペースメーカー作動不全がない 2. 創部から出血がない 3. 局所感染がない			# 退院後の生活がイメージでき、注意点が理解できる 1. 自己検脈		
処 置	<ul style="list-style-type: none"> 体温、脈拍、血圧を測定します。 24時間モニター心電図をつけます。 	<ul style="list-style-type: none"> 体温、脈拍、血圧を測定します。 24時間モニター心電図をつけます。 	<ul style="list-style-type: none"> 体温、脈拍、血圧を測定します。 24時間モニター心電図をつけます。 	<ul style="list-style-type: none"> 体温、脈拍、血圧を測定します。 24時間モニター心電図をつけます。 	<ul style="list-style-type: none"> 体温、脈拍、血圧を測定します。 創部にはられたドレッシング剤を剥がします。 24時間モニター心電図をつけます。 	<ul style="list-style-type: none"> 体温、脈拍、血圧を測定します。 モニター心電図をはずします。
薬		<ul style="list-style-type: none"> 中止薬(ビグアナイド製剤)がある場合、本日朝より再開することを説明します。 				
検 査				<ul style="list-style-type: none"> 必要に応じて運動負荷試験を行うことがあります。 	<ul style="list-style-type: none"> 血液検査をします。 胸のレントゲン写真をとります。 ペースメーカーの検査を行います。 	<ul style="list-style-type: none"> 退院後、初回外来受診時に胸のレントゲン写真、心電図、ペースメーカーの検査を行います。
食 事 飲 水	<ul style="list-style-type: none"> 通常通りですが、食べ過ぎ・飲みすぎには注意してください。 					
活 動	<ul style="list-style-type: none"> 手術をした方の腕は90度以上 挙げないようにして下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術をした方の腕は90度以上挙げないようにして下さい。 	<ul style="list-style-type: none"> 手術をした方の腕は自由になります。 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません。 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません。 	<ul style="list-style-type: none"> 制限はありません。
清 潔	<ul style="list-style-type: none"> 手術後6日目までは、シャワー・入浴はできません。タオルで体をお拭きします。 					<ul style="list-style-type: none"> 入浴ができます。
説 明 指 導	<ul style="list-style-type: none"> 看護師より自己検脈及び、退院後の生活について説明します。 退院後、初回外来受診時の検査について説明します。 退院までに、ケースワーカーとの面談があります。 創部の発赤・熱感・浸出液が見られた場合はすぐに病院へご連絡下さい。 必要に応じて医師から日常生活について確認があります。 					
	<ul style="list-style-type: none"> 週に1度、薬剤師より薬について説明いたします。 					

※状況に応じて、予定が変更になる場合があります。不明な点がありましたら、ご遠慮せずおたずねください。

平成29年2月7日改訂